

Study code (not the name)

Date _____

How to perform / Cómo hacer el registro

One row = one minute. If the cuff marks an error, write 0 in the cell; never leave the cell empty. Position words: Supine · Standing · Sitting. Un renglón = un minuto. Escriba 0 en la celda cuando el manguito marque error en la lectura; nunca deje la celda vacía. Palabras de posición: Supino · De pie · Sentado.

01	1st supine — continuous BP and pulse, lying down, 15 minutes.	1er supino — PA y pulso continuos, acostado, 15 minutos.
02	Passive standing — the person stands; keep reading 20 minutes. Minutes 3 and 10 are the nOH marks.	Bipedestación pasiva — se pone de pie; siga 20 minutos. Los minutos 3 y 10 son las marcas de nOH.
03	2nd supine — back lying down, 5 minutes.	2° supino — de nuevo acostado, 5 minutos.
04	Sitting — BP and pulse, 2 minutes.	Sentado — PA y pulso, 2 minutos.
05	If the patient talks, feels pain, or grabs the free hand, please continue recording and put an observation about the action he/she was doing in the commentaries section of the Baroreflex sheet.	Si el paciente habla, siente dolor o aprieta la mano libre, continúe el registro y anote en la sección de comentarios de la hoja de baroreflejo una observación de la acción que estaba haciendo.
06	Fill the Survey sheet: pick No, Past, or Current for every condition they have had or have now. The survey is in the same workbook as the BaroSheet so history and the trace are one record.	Llene la hoja Survey: elija No, Previo o Actual en cada condición que hayan tenido o tengan ahora. La encuesta está en el mismo libro que el BaroSheet, para que historia y trazo sean un solo registro.

Who can have this assessment / Quiénes pueden hacerse este registro

Children, adolescents, and adults. After an infection, in synucleinopathies, autoimmunity, or without a cause yet. Niños, adolescentes y adultos. Tras una infección, en sinucleinopatías, autoinmunidad o sin causa aún clara.

When a specific diagnosis is suspected / Cuando se sospecha: Parkinson's disease and other degenerative parkinsonisms; multiple system atrophy; dementia with Lewy bodies; pure autonomic failure; neurogenic orthostatic hypotension; POTS; neurally mediated vasovagal syncope; neurogenic hypertension; labile episodic hypertension; secondary paroxysmal neurogenic hypertension; autoimmune autonomic ganglionopathy; Huntington's disease; normal-pressure hydrocephalus; ataxias; adult-onset leukodystrophies; functional neurological disorders; difficult-to-control migraine; hypermobile spectrum; small fiber neuropathy; fibromyalgia; adenomyosis; other dysautonomias. Centro Santa Fe · autonomiaclinicsf.com

Visit history / Historia de la visita

Age _____	Sex _____	Pressor meds _____
Neck surgery Y / N	Carotid endarterectomy / neck vascular surgery Y / N	Neck cancer or radiation Y / N
Medical history _____		

Consensus definitions / Definiciones de consenso

Neurogenic OH (nOH) Sustained SBP drop ≥ 20 mmHg or DBP drop ≥ 10 mmHg within 3 minutes of standing, with inadequate HR rise < 15 bpm.	Hipotensión ortostática neurógena (nOH) Caída sostenida de PAS ≥ 20 mmHg o PAD ≥ 10 mmHg en los 3 primeros minutos de bipedestación, con aumento inadecuado de FC < 15 lpm.
Non-neurogenic OH The same BP criteria within 3 minutes of standing, with an appropriate HR rise ≥ 15 bpm.	OH no neurógena Los mismos criterios de PA en 3 minutos, con aumento apropiado de FC ≥ 15 lpm.
Delayed OH The same BP criteria first occurring after 3 minutes of standing.	OH tardía Los mismos criterios de PA que aparecen por primera vez después de los 3 minutos.
Afferent baroreflex dysfunction Sensing / buffering failure — vasovagal (neurally mediated) syncope and labile episodic hypertension. Not autonomic failure.	Disfunción del baroreflejo aferente Falla de detección / amortiguamiento — síncope vasovagal (neuromediado) e hipertensión episódica lábil. No es falla autonómica.
Neurogenic supine hypertension Supine SBP ≥ 140 mmHg and/or DBP ≥ 90 mmHg in the presence of autonomic failure.	Hipertensión supina neurógena PAS supina ≥ 140 mmHg y/o PAD ≥ 90 mmHg en presencia de falla autonómica.

Freeman R, et al. Clin Auton Res. 2011;21(2):69-72. · Idiaquez JF, et al. Am J Hypertens. 2021;34(2):125-133. · Gibbons CH, et al. J Neurol. 2017;264(8):1567-1582.

Recording sheet / Hoja de registro — continuous BP and pulse

Write the cuff value each minute. If the patient talks, feels pain, or grabs the free hand, continue recording and note the action in Comment. Escriba el valor de cada minuto. Si habla, siente dolor o aprieta la mano libre, continúe y anote la acción en Comment.

1st SUPINE / 1er SUPINO 15 min				
min	SBP	DBP	HR	Comment
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

2nd SUPINE / 2º SUPINO 5 min				
min	SBP	DBP	HR	Comment
1				
2				
3				
4				
5				

SITTING / SENTADO 2 min				
min	SBP	DBP	HR	Comment
1				
2				

STANDING / DE PIE 20 min (marks at 3' and 10')				
min	SBP	DBP	HR	Comment
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				